

Carbon Monoxide (CO) poisoning

تسمم أول أكسيد الكربون

Source

الحرائق - الدفايات - سخانات الغاز

Management

1. General & supportive measures (as before)

أهم نقطة انك تبعد العيان عن مصدر الغاز و تطلعه في الهواء الطلق

2. راحة تامة و تقليل الحركة لتقليل احتياج الأوكسجين

3. Antidote

Oxygen 100% by mask

تحطه على ماسك متوصل بأوكسجين تركيز عالي

Benzodiazepine poisoning

المهدئات

Source

1. Diazepam (Neuril – Valpam – Valium)
2. Lorazepam (Ativan)
3. Oxazepam (Oxepam)
4. Clonazepam (Revotril – Apetryl – Amotril – Clopam) أبو صليبة
5. Bromazepam (Calmepam)
6. Alprazolam (Xanax – Zolam – Alprax)

Diagnosis

1. اهله أو اصحابه عارفين انه ببيلبع اقراص أو واخذ جرعة عالية عشان ينتحر
2. عيان جايلك تايه و داخ و بيقطع في الكلام و عينه مزغلة و بيتطوح

Management

1. General measures & Decontamination (as before)

2. غسيل المعدة + فحم نشط + جرعة من الملين

3. Antidote

Anexate ampoules (one amp .. 102 LE)

5 ml ampoule contains 0.5 mg (each ml = 0.1 mg)

أمبول واحد في الوريد بحد أقصى ٤ أمبولات (٢ مجم)

معظم المرضى بيتحسنوا بعد أمبول أو أمولين

Opioid poisoning المخدرات

Source

1. الهيروين و المورفين

2. الكودايين (في بعض أدوية الكحة زي الكوديلار)

3. Tramadol (Tramal – Tramadol – Tamol – Ultradol)

Diagnosis

1. اهله أو اصحابه عارفين انه بيبلع اقراص أو واخذ جرعة عالية عشان ينتحر

2. Diagnostic triad of:

Disturbed consciousness + Pinpoint pupil + Slow HR & RR

Management

1. General measures & Supportive measures (as before)

اهم حاجة العناية بالتنفس و الضغط .. احتقان الرئة بالسوائل و انخفاض الضغط شائع
و قد يحتاج الى علاج في عناية مركزة و تحويل سريع للحالة

2. غسيل المعدة + فحم نشط + جرعة من الملين

3. Antidote

Naloxone ampoules (one amp .. 18.5 LE)

Narcan ampoules (one amp .. 30 LE)

1 ml ampoule contain 0.4 mg

أمبول على ٢٠٠ سم محلول ملح على مدار ساعة مع متابعة الحالة
(ممكن يعطى وريد على طول بس لا يفضل في حالة وجود ادمان)

Tramadol

الترامادول

- أشهر مخدر يستخدم في مصر
- سبب شهرته الكبيرة هو قدرته على زيادة التحمل بشكل عام
- مثل تحمل ضغط الشغل و التعب و المشاكل
- بعض الرجال يستخدموه بغرض إطالة فترة الانتصاب
- **Presentation :**
 - CNS depression + Respiratory failure يا يبجي كدة
 - Convulsions + Hyperglycemia يا يبجي كدة
 - Pinpoint pupils في العائلة دي اللي مش يبجي بالوحيد الترامادول
- **Treatment :**
 - IV fluids
 - For CNS depression & respiratory failure → Naloxone
 - For convulsions & hyperglycemia → anticonvulsant + insulin

مريض واخذ أقراص مخدرة جاي بدوخة و زغللة و بيتطوح بس فايق .. أعمله ايه ؟

دي مش حالة طوارئ ولا تستدعي العلاج باستخدام الأدوية السابق ذكرها
لكن لازم تشوف العلامات الحيوية للمريض و لو كويسة هتخليه معاك تحت الملاحظة
تحسباً لحدوث مشكلة تستدعي التدخل الطارئ مثل
(خلل في العلامات الحيوية – تشنجات – غيبوبة)